



EN - Silicone Bracket Relief Aid

DE - Bracket Abdecksilikon

FR - Produit de soulagement à la silicone pour bracket

NL - Silicone beugelontlastingsmiddel

IT - Silicone di copertura dei bracket

ES - Silicona de Alivio para Brackets

PT - Auxiliar de alívio em silicone para brackets

SV - Lindringshjälpmedel av silikon för tandställning

DA - Silikone til lindring af bøjlegener

FI - Oikomislaitteiston aiheuttamaa ärsytystä  
lievittävä hyytelö

NO - Lindrende silikon for klammer

EL - Βοηθητικό ανακούφισης αγκίστρου από σιλικόνη

**Description:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid is a flavored, thixotropic, silicone elastomer that holds firmly to brackets and wires. It comes in a syringe with two barrels. One barrel has a white activator material. The other has a light yellow base material. A pea sized amount of Gishy Goo is dispensed by the patient into their hand, then mixed and applied to bracket or wires at the point of irritation. The product sets in two minutes and stays in place for up to 12 hours.

**Indications:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid provides mechanical relief and a protective barrier to prevent irritation of soft tissue caused by orthodontic appliances. Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid is applied to points of irritation on brackets, wires and fixed/functional appliances.

**Ingredients:**

Metaloxide, Metalhydroxide, Polydimethylsiloxane, Paraffin, Silicates, Platinum Complex, Bubblegum Flavor, FD&C Yellow No 6.

**Storage:**

Keep Gishy Goo at room temperature. Do not store in hot places or direct sunlight, as Gishy Goo may not set effectively.

**General Warnings and Precautions:**

1. Warning: Do not use if you have an allergy to silicones.
2. Do not handle using latex gloves.
3. We highly recommend that children under the age of 12 be supervised or assisted by parents when using and applying Gishy Goo. Gishy Goo may represent a choking hazard to children 4 years of age and younger.
4. Do not eat. (Large amounts may present a choking hazard.)
5. The maximum amount of Gishy Goo for each sore spot is about the size of a pea. If you squeeze out too much, throw it away and try again.
6. You should be mixing equal amounts of white and colored Gishy Goo. If you don't have about the same amounts, throw away and try again.
7. Take Gishy Goo off of brackets before sleeping, eating, or drinking, to avoid the chance of choking.
8. Store Gishy Goo at room temperature.
9. Don't store Gishy Goo near heaters or leave it in hot cars, or it might not set properly.
10. Don't squeeze or stick Gishy Goo on clothes or fabric, as it may stain.



Remove cap by twisting to the left one-quarter turn (cap only twists one way) and pulling cap off.



Squeeze out a pea-sized amount onto finger or hard surface. Be sure to get the same amount of both white and colored material. If only one color comes out, throw that material away and try again.



Mix by hand for about 10 seconds.



Place mixed Gishy Goo on the brackets at the point of irritation. Gishy Goo takes about 2 minutes to set.



After use, put the cap back on and twist one-quarter turn to right. Make sure cap is on tightly.

Gishy Goo may remain in place for up to 12 hours. Remove all Gishy Goo from brackets before going to sleep, eating or drinking.

**Beschreibung:**

Gishy Goo™ Bracket-Abdecksilikon ist ein aromatisiertes, thixotropes Silikonelastomer, das fest an Brackets und Drähten haftet. Es wird in einer Doppelkolbenspritze geliefert. Ein Kolben enthält ein weißes Aktivormaterial. Der andere enthält ein hellgelbes Basismaterial. Eine erbsengroße Menge wird vom Patienten in seine Hand gepresst, dann zusammengemischt und an der gereizten Stelle an das Bracket bzw. den Draht gedrückt. Das Produkt bindet innerhalb von zwei Minuten ab und bleibt für bis zu 12 Stunden haften.

**Anwendungsbereiche:**

Gishy Goo™ Bracket-Abdecksilikon bietet eine mechanische Abhilfe und eine Schutzbarriere, die Reizungen von Weichgeweben durch kieferorthopädische Geräte verhindert. Gishy Goo Bracket-Abdecksilikon wird an den Punkten an Brackets, Drähten und fixierten/funktionellen Systemen angewendet, an denen es zu Reizungen kommt.

**Lagerung:**

Gishy Goo ist bei Raumtemperatur zu lagern. Nicht an heißen Orten oder bei direkter Sonneneinstrahlung lagern, da Gishy Goo möglicherweise nicht erfolgreich abbindet.

**Allgemeine Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen**

1. Warnung: Nicht verwenden, wenn Sie auf Silikone allergisch sind.
2. Nicht mit Latexhandschuhen handhaben.
3. Wir empfehlen, Kinder im Alter von unter 12 Jahren bei der Anwendung von Gishy Goo zu überwachen bzw. ihnen zu helfen. Gishy Goo kann für Kinder von 4 Jahren und jünger Erstickungsgefahr darstellen.
4. Nicht verzehren. (Große Mengen können Erstickungsgefahr darstellen.)
5. Die größte Menge an Gishy Goo für jede schmerzende Stelle ist die Größe einer Erbse. Wenn Sie zu viel herausdrücken, werfen Sie das Produkt weg und versuchen Sie es noch einmal.
6. Nehmen Sie die gleiche Menge von weißem und farbigem Gishy Goo. Wenn Sie nicht die gleiche Menge haben, werfen Sie alles weg und versuchen Sie es noch einmal.
7. Nehmen Sie Gishy Goo von den Brackets vor dem Schlafengehen, Essen oder Trinken, um die Gefahr von Erstickung zu vermeiden.
8. Gishy Goo soll stets bei Zimmertemperatur gelagert werden.
9. Das Material vor Wärme schützen, da sich dadurch die Aushärtung verändern kann.
10. Gishy Goo nicht auf Kleider aus Stoff pressen oder drücken, da es Flecken hinterlassen kann.



Entfernen Sie die Kappe, indem Sie diese eine viertel Drehung nach links drehen (die Kappe lässt sich nur in eine Richtung drehen). Ziehen Sie die Kappe ab.



Drücken Sie eine erbsengroße Menge auf Ihre Finger oder auf eine harte Oberfläche. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie die gleichen Mengen des weißen und des farbigen Materials herausdrücken. Werfen Sie das Material weg und versuchen Sie es erneut, falls nur eine Farbe herauskommt.



Vermengen Sie das Material für ca. 10 Sekunden.



Tragen Sie das gemischte Gishy Goo Material in dem Bereich der Zahnspange auf, der die Druckstelle auf der Mundschleimhaut verursacht hat. Gishy Goo härtet in ca. 2 Minuten aus.



Stecken Sie die Kappe nach der Benutzung wieder auf die Spritze und drehen diese eine viertel Drehung nach rechts. Stellen Sie sicher, dass die Kappe festsitzt.

Gishy Goo kann bis zu 12 Stunden im Mund verbleiben. Entfernen Sie alle Reste von Gishy Goo bevor Sie essen, trinken oder schlafen gehen.

**Description:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid est un élastomère de silicone thixotrope aromatisé qui adhère solidement aux brackets et aux fils. Il est accompagné d'une seringue à double cylindre. Un cylindre contient un activateur blanc, tandis que l'autre contient une base jaune clair. Une quantité de produit équivalente à celle d'un petit pois est appliquée sur le bracket ou les fils, au niveau de l'irritation. Le produit durcit en deux minutes et reste en place jusqu'à 12 heures.

**Indications:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid réduit les contraintes mécaniques et offre une barrière de protection pour éviter l'irritation des tissus mous causée par les appareils orthodontiques. Gishy Goo est appliqué aux points d'irritation sur les brackets, les fils et les appareils fixes / fonctionnels.

**Entreposage :**

Gardez Gishy Goo à température ambiante. Ne l'entrez pas dans des endroits chauds ni à la lumière directe du soleil, car Gishy Goo pourrait ne pas durcir de façon efficace.

**Avertissement et précautions générales :**

1. Avertissement : Ne pas utiliser si vous êtes allergiques aux silicones.
2. Ne pas manipuler avec des gants en latex.
3. Nous recommandons fortement que les enfants de moins de 12 ans soient surveillés ou aidés par leurs parents lors de l'utilisation et de l'application de Gishy Goo. Gishy Goo peut poser un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 4 ans.
4. Ne pas ingérer. (De grandes quantités peuvent poser un risque d'étouffement).
5. La quantité maximale de Gishy Goo pour chaque point sensible est de la taille d'un pois. Si vous en exprimez de trop, jetez-le et ré-essayez.
6. Vous devriez mélanger des quantités égales de Gishy Goo blanc et jaune. Si les quantités ne sont pas identiques, jetez-le et ré-essayez.
7. Retirez Gishy Goo des brackets avant de vous coucher, de manger ou de boire pour éviter le risque d'étouffement.
8. Conservez Gishy Goo à température ambiante.
9. Ne laissez pas Gishy Goo près de radiateurs et ne le laissez pas dans une voiture chaude, sinon il ne pourra pas prendre correctement.
10. N'exprimez et ne collez pas Gishy Goo sur vos vêtements, car il peut tacher.



Enlevez le capuchon en dévissant vers la gauche d'un quart de tour (le capuchon ne se dévisse que dans un sens) et tirez sur le capuchon pour le dégager.



Pressez l'équivalent d'un petit pois sur votre doigt ou sur une surface dure. Assurez-vous que vous sorti la même quantité de matériau blanc et de matériau coloré. Si une seule couleur ne sort, jetez ce matériau et recommencez.



Mélangez à la main pendant environ 10 secondes.



Mettez le Gishy Goo mélangé sur les brackets à l'endroit irrité. Gishy Goo demande environ deux minutes de prise.



Après utilisation, remettez le capuchon en place et vissez-le d'un quart de tour vers la droite. Assurez vous que le capuchon est bien serré.

Gishy Goo peut rester en place jusqu'à 12 heures d'affilées. Enlevez tout Gishy Goo des brackets avant de vous endormir, de manger ou de boire.

## **Beschrijving:**

**NL**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid is een thixotropo silicone-elastomeer met smaak dat zich stevig hecht aan beugels en draadjes. Het komt in een spuit met twee vaten. Het ene vat heeft een witte activatorstof. Het andere heeft een lichtgele basisstof. Breng een portie in de grootte van een erwt aan op de plaats van irritatie op de beugel of draadjes. Het product wordt in twee minuten hard en blijft tot 12 uur op zijn plaats.

## **Indicaties:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid verleent mechanische ontlasting en een beschermende barrière om de irritatie van zacht weefsel door orthodontische hulpmiddelen te voorkomen. Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid kan aangebracht worden op geïrriteerde plekken op beugels, draadjes en vaste/functionele hulpmiddelen.

## **Bewaring:**

Gishy Goo bij kamertemperatuur bewaren. Niet op warme plaatsen of in direct zonlicht bewaren omdat Gishy Goo dan niet goed uithardt.

## **Algemene waarschuwing en voorzorgsmaatregelen:**

1. Waarschuwing: Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent tegen siliconen.
2. Gebruik dit product niet met latex handschoenen.
3. Wij raden ten zeerste aan kinderen jonger dan 12 jaar Gishy Goo alleen te laten gebruiken en aanbrengen onder toezicht of met de hulp van een ouder. Gishy Goo kan verstikkingsgevaar vormen voor kinderen van 4 jaar of jonger.
4. Het product niet opeten. (Grote hoeveelheden kunnen verstikkingsgevaar vormen).
5. Breng niet meer dan een hoeveelheid Gishy Goo ongeveer ter grootte van een erwt aan per zere plek. Als u te veel uitspuit, moet u het weggooien en opnieuw proberen.
6. Meng gelijke hoeveelheden witte en gekleurde Gishy Goo. Als de hoeveelheden niet ongeveer gelijk zijn, moet u het weggooien en opnieuw proberen.
7. Verwijder Gishy Goo van brackets voor het slapengaan, eten of drinken om verstikkingsgevaar te vermijden.
8. Bewaar Gishy Goo bij kamertemperatuur.
9. Bewaar Gishy Goo niet in de buurt van kachels en laat het niet achter in hete voertuigen, omdat het anders niet goed kan uitharden.
10. Spuit of plak Gishy Goo niet op stoffen kleding om vlekken te voorkomen.





Verwijder de dop door deze een kwartslag naar links te verdraaid (de dop kan slechts in één richting worden draaien) en de dop er dan af te trekken.



Spuit een hoeveelheid ter grootte van een erwt op uw vinger of een hard oppervlak. Zorg ervoor dat u een gelijke hoeveelheid wit en gekleurd materiaal hebt. Als er slechts één kleur uitkomt, gooi het dan weg en probeer het opnieuw.



Meng het ca. 10 seconden met de hand.



Breng de gemengde Gishy Goo aan op het irritatiepunt van de beugels. Gishy Goo hardt in ongeveer 2 minuten uit.



Plaats de dop er na gebruik weer op en draai deze een kwartslag naar rechts. Controleer of de dop weer goed vastzit.

Gishy Goo mag max. 12 uur op zijn plaats blijven zitten. Verwijder alle Gishy Goo van de beugels voordat u gaat slapen, eten of drinken.

## Descrizione

Il silicone di copertura dei bracket Gishy Goo™ è un elastomero siliconico, tissotropico, aromatizzato che aderisce stabilmente ai bracket e ai fili. È confezionato in una siringa doppia. Un cilindro contiene una pasta bianca (attivatore), l'altro invece una pasta giallo chiaro (base). Il paziente preleva con mano una quantità di prodotto della grandezza di un pisello, la miscela e la applica sul bracket o sui fili, nell'area irritata. Il prodotto indurisce in due minuti e rimane in posizione fino a 12 ore.

## Indicazioni

Il silicone di copertura dei bracket Gishy Goo™ fornisce un sollievo meccanico e forma una barriera protettiva che previene l'irritazione dei tessuti molli causata dagli apparecchi ortodontici. Il silicone di copertura dei bracket Gishy Goo si applica sui bracket, sui fili e sugli apparecchi fissi/funzionali, in corrispondenza delle aree irritate.

## Conservazione

Tenere Gishy Goo a temperatura ambiente. Non conservare in luoghi caldi o esporre alla luce solare diretta, altrimenti Gishy Goo potrebbe non polimerizzare correttamente.

## Avvertenze generali e precauzioni

1. Avvertenza: non usare in caso di allergia ai siliconi.
2. Non maneggiare indossando guanti in lattice.
3. Consigliamo vivamente che i bambini sotto i 12 anni siano assistiti/supervisionati dai genitori quando usano e applicano Gishy Goo. Per i bambini di età pari o inferiore a 4 anni, Gishy Goo può rappresentare un rischio di soffocamento.
4. Non ingerire: grandi quantità possono causare soffocamento.
5. La quantità massima di Gishy Goo per ogni punto dolente non deve essere più grande di un pisello. Se avete erogato troppo materiale, gettatelo e prelevate nuovo materiale.
6. Miscelare sempre le stesse quantità di Gishy Goo bianco e colorato. Se le due quantità non sono simili, gettarle e prelevare nuovo materiale.
7. Rimuovere Gishy Goo dai bracket prima di andare a dormire, mangiare o bere, per evitare il rischio di soffocamento.
8. Conservare Gishy Goo a temperatura ambiente.
9. Non conservare Gishy Goo vicino a fonti di calore o lasciarlo in un'automobile al sole, perché potrebbe non polimerizzare correttamente.
10. Non erogare o attaccare Gishy Goo su vestiti o tessuti, poiché potrebbe macchiare.



Levare il cappuccio blu girandolo verso sinistra di un quarto di giro (il cappuccio gira solo in una direzione), quindi sfilarlo.



Far uscire una quantità di prodotto della grandezza di un pisello su un dito o su una superficie dura. Assicurarsi di avere la stessa quantità di materiale bianco e colorato. Se esce solo uno dei due materiali colorati, gettarlo e prelevare nuovo materiale.



Miscelare tra le dita per circa 10 secondi.



Posizionare Gishy Goo miscelato sul bracket dove si presenta l'irritazione. Gishy Goo polimerizza in circa 2 minuti.



Dopo l'uso richiudere la siringa con il cappuccio blu girando verso destra di un quarto di giro. Assicurarsi che il cappuccio sia ben chiuso.

Gishy Goo può restare in posizione fino a 12 ore. Rimuoverae Gishy Goo completamente dal bracket prima di mangiare, di bere o di andare a dormire.

**Descripción:**

Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid™ es un elastómetro de silicona saborizado tixotrópico que se sostiene firmemente a soportes y alambres. Incluye una jeringa con dos barriles. Un barril posee un material activador de color blanco. El otro contiene un material base de color amarillo. Se aplica una cantidad del tamaño de un guisante sobre el soporte o alambre en el punto de irritación. El producto se asienta en dos minutos y permanece en su lugar durante 12 horas.

**Indicaciones:**

Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid™ propociona alivio mecánico y una barrera protectora que evita la irritación del tejido blando provocada por los dispositivos de ortodoncia. Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid™ se aplica en los puntos de irritación sobre soportes, alambres y dispositivos fijos o funcionales.

**Almacenaje:**

Mantenga Gishy Goo a temperatura ambiente. No la almacene en lugares calientes o directamente al sol, ya que Gishy Goo puede no endurecer en forma efectiva.

**Advertencias y Precauciones Generales:**

1. Advertencia: no la utilice si tiene alergia a las siliconas.
2. No la manipule con guantes de látex.
3. Recomendamos fehacientemente que los niños menores de 12 años sean supervisados o ayudados por sus padres cuando utilicen y se coloquen Gishy Goo. Gishy Goo puede presentar un peligro de asfixia para niños de 4 años o menores.
4. No la ingiera. (Grandes cantidades pueden presentar peligro de asfixia).
5. La cantidad máxima de Gishy Goo para cada zona dolorida es aproximadamente del tamaño de un maní. Si dispensa demasiado, descártela e intente nuevamente.
6. Se deberían mezclar cantidades iguales de Gishy Goo blanca y de color. Si no obtiene aproximadamente las mismas cantidades, descártela e intente nuevamente.
7. Retire Gishy Goo de los brackets antes de dormir, comer o beber, para evitar la posibilidad de asfixia.
8. Almacene Gishy Goo a temperatura ambiente.
9. No almacene Gishy Goo cerca de estufas ni lo deje en vehículos calientes, pues puede no endurecer correctamente.
10. Gishy Goo no debe dispensarse en prendas de vestir o telas, ni adherirse a ellas, pues puede manchar.



Remueva la tapa desenroscándola un cuarto de giro hacia la izquierda (la tapa solo gira hacia un lado) y tire de ella para retirarla.



Oprima para dispensar una cantidad del tamaño de un maní sobre el dedo o una superficie rígida. Asegúrese de dispensar la misma cantidad de ambos materiales (blanco y de color). Si sale un solo color, descarte el material e intente nuevamente.



Mezcle a mano unos 10 segundos.



Coloque Gishy Goo ya mezclado sobre los brackets en la zona irritada. Gishy Goo endurece en unos 2 minutos.



Después del uso, vuelva a colocar la tapa y gire hacia la derecha un cuarto de vuelta. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

Gishy Goo puede permanecer en posición hasta 12 horas. Retire todo el Gishy Goo de los brackets antes de dormir, comer o beber.

**Descrição:**

Auxiliar de alívio de brackets em silicone Gishy Goo é um elastómero de silicone tixotrópico com sabor que adere firmemente aos brackets e aos arames. É fornecido numa seringa com dois cilindros. Um cilindro possui um material ativador branco. O outro contém um material base amarelo claro. Uma quantidade equivalente a uma ervilha é aplicada em brackets e arames no ponto de irritação. O produto polimeriza em dois minutos e permanece em posição até 12 horas.

**Indicações:**

Auxiliar de alívio de brackets em silicone Gishy Goo proporciona um alívio mecânico e uma barreira protetora para evitar a irritação do tecido mole provocada por aparelhos ortodônticos. O auxiliar de alívio de brackets em silicone Gishy Goo é aplicado em pontos de irritação em brackets, arames e aparelhos fixos/funcionais.

**Armazenamento:**

Guardar o Gishy Goo à temperatura ambiente. Não guardar em lugares quentes ou luz solar direta, dado o Gishy Goo poder não endurecer eficazmente.

**Advertências e precauções gerais:**

1. Advertência: não utilizar se existirem alergias conhecidas a silicones.
2. Não manusear com luvas de látex.
3. Recomendamos que crianças com idade inferior a 12 anos sejam supervisionadas ou assistidas pelos pais na utilização e aplicação do Gishy Goo. Gishy Goo poderá representar um perigo de asfixia para crianças com idade igual ou inferior a 4 anos.
4. Não ingerir. (Grandes quantidades podem representar um perigo de asfixia).
5. A quantidade máxima de Gishy Goo para cada ponto dorido é aproximadamente o equivalente ao tamanho de uma ervilha. Se espremer demasiado produto, descartar e tentar novamente.
6. Deverá misturar quantidades iguais de Gishy Goo branco e colorido. Se não tiver a mesma quantidade, descartar e tentar novamente.
7. Retirar o Gishy Goo dos brackets antes de dormir, comer, beber para evitar a possibilidade de asfixia.
8. Guarde o Gishy Goo a temperatura ambiente.
9. Não guarde o Gishy Goo próximo de aquecedores nem o deixe em automóveis quentes, caso contrário poderá não endurecer correctamente.
10. Não espremer nem colar Gishy Goo em vestuário ou tecidos, poderá manchar.



Retire a tampa rodando-a para a esquerda um quarto de volta (a tampa roda apenas numa direção) puxando a tampa para fora.



Esprema sobre o dedo ou uma superfície dura uma quantidade equivalente ao tamanho de uma ervilha. Certifique-se de que tem a mesma quantidade de material branco e colorido. Se sair apenas uma cor, descarte esse material e tente novamente.



Misture com a mão durante aproximadamente 10 segundos.



Coloque o Gishy Goo misturado sobre os brackets no local da irritação. Gishy Goo demora aproximadamente 2 minutos a endurecer.



Após a utilização, coloque novamente a tampa e rode um quarto de volta para a direita. Certifique-se de que a tampa está bem apertada.

Gishy Goo poderá permanecer aplicado até 12 horas. Retire a totalidade de Gishy Goo dos brackets antes de dormir, comer ou beber.

**Beskrivning:**

Gishy Goo™-lindringshjälp för silikonbrygga är en smaksatt tixotrop silikonelastomer som hålls stadigt fäst vid bryggor och trådar. Den levereras i en spruta med två cylindrar. Den ena cylindern har ett vitt aktiveringsmaterial. Den andra har ett ljusgult basmaterial. En mängd av en ärtas storlek dispensereras av patienten i handen, blandas och appliceras sedan på brygga eller trådar vid stället för irritation. Produkten stelnar på två minuter och förblir på plats i upp till 12 timmar.

**Indikationer:**

Gishy Goo™-lindringshjälp för silikonbryggor ger mekanisk lindring och en skyddsbarriär för att förhindra irritation av mjukvävnaden som orsakas av tandregleringsanordningar. Gishy Goo-lindringshjälp för silikonbrygga appliceras på irritationsställen på bryggor, trådar och fasta/funktionella anordningar.

**Förvaring:**

Förvara Gishy Goo i rumstemperatur. Får inte förvaras på heta platser eller i direkt solljus då Gishy Goo då inte kan stelna effektivt.

**Varningar och försiktighetsåtgärder:**

1. Varning: Använd inte om du är allergisk mot silikon.
2. Får inte hanteras med latexhandskar.
3. Vi rekommenderar varmt att barn under 12 år övervakas eller assisteras av föräldrarna vid användning eller applicering av Gishy Goo. Gishy Goo kan innebära kvävningsfara för barn i 4 års ålder eller yngre.
4. Får inte förtäras.(stora mängder kan utgöra en kvävningsfara).
5. Den största mängden Gishy Goo för varje enskilt ömt ställe är av en ärtas storlek. Om du trycker ut för mycket, kasta bort och försök på nytt.
6. Du ska blanda lika delar vitt och färgat Gishy Goo. Om du inte får fram lika stora mängder, kasta bort och försök på nytt.
7. Avlägsna Gishy Goo från bryggorna före du sover, äter eller dricker för att undvika risk för kvävning.
8. Förvara Gishy Goo i rumstemperatur.
9. Förvara inte Gishy Goo nära värmeelement och lämna det inte i heta bilar då detta kan inverka på hur effektivt det stelnar.
10. Var försiktig så att Gishy Goo inte trycks ut eller fastnar på kläder eller tyg då det kan färga.





Avlägsna locket genom att skruva ett fjärdedelsvarv åt vänster (hatten vrids endast åt ett håll) och ta av locket.



Pressa ut en mängd av en ärtas storlek på fingret eller på ett hårt underlag. Försäkra dig om att du får lika delar av både vitt och färgat material. Om endast en färg kommer ut, kasta bort materialet och pröva på nytt.



Blanda för hand cirka 10 sekunder.



Placera blandat Gishy Goo på bågfästena vid det irriterade stället. Det tar cirka 2 minuter för Gishy Goo att stelna.



Lägg tillbaka locket efter användning och vrid ett fjärdedelsvarv till höger. Kontrollera att locket är stadigt på.

Gishy Goo kan lämnas på plats upp till 12 timmar. Avlägsna allt Gishy Goo från bågfästena innan du lägger dig, äter eller dricker.

**Beskrivelse:**

Gishy Goo™ silikone beslag lindring er en aromatiseret, tixotropisk, silikone elastomer, der holder fast på beslag og ledninger. Det leveres i en sprøjte med to beholdere. Den ene beholder har et hvidt aktiveringsmateriale. Den anden har et lysegult basismateriale. Påfør en ærtstor mængde på beslag eller ledninger ved irritationspunktet. Produktet sætter sig på to minutter og bliver siddende i 12 timer.

**Indikationer:**

Gishy Goo™ silikone beslag lindring yder mekanisk lindring og en beskyttende barriere til at forebygge irritation af blødt væv forårsaget af ortodontiske apparater. Gishy Goo™ silikone beslag lindring påføres irritationspunktet på beslag, ledninger og faste/funktionelle apparater

**Opbevaring:**

Opbevar Gishy Goo ved stuetemperatur. Undlad at opbevare på varme steder eller i direkte sollys, da Gishy Goo ellers ikke vil hærdes ordentligt.

**Generelle advarsler og forholdsregler:**

1. Advarsel: Du må ikke anvende produktet hvis du er allergisk overfor silikone.
2. Du må ikke bruge latexhandsker under håndtering.
3. Vi anbefaler at børn under 12 år vejledes af en voksen når de anvender Gishy Goo. Gishy Goo kan udgøre kvælningfare for børn under 4 år.
4. Kun til udvortes brug. (Store mængder kan udgøre kvælningfare).
5. Den maksimale mængde af Gushy Goo til hvert ømt sted svarer til størrelsen på en ært. Hvis du trykker for meget ud på en gang, så bortskaf det og prøv igen.
6. Du bør blande lige store mængder hvidt og farvet Gishy Goo. Hvis du ikke har lige meget af hver, så bortskaf det og prøv igen.
7. Fjern Gishy Goo fra bøjler inden du sover, spiser eller drikker for at undgå faren for kvælning.
8. Gishy Goo skal opbevares ved stuetemperatur.
9. Gishy Goo må ikke opvarmes tæt på varmeapparater eller efterlades i varme biler, da det kan forhindre materialet i at hærde ordentligt.
10. Undlad at få Gishy Goo på dit tøj, da det kan plette.



Tag hættten af ved at dreje den mod venstre en kvart omgang (hættten kan kun drejes én vej) og træk den af.



Klem en størrelse på en ært ud på en finger eller hård overflade. Sørg for at få samme størrelse hvidt og farvet materiale ud. Hvis der kun kommer en farve ud, skal du smide materialet ud og prøve igen.



Blandes i hånden i ca. 10 sekunder.



Anbring det blandede Gishy Goo på brackets og bøjler, der hvor de generer. Gishy Goo tager ca. 2 minutter om at hærde.



Efter brug skal hættten sættes på igen og drejes en kvart omgang mod højre. Sørg for, at hættten sidder godt fast.

Gishy Goo kan blive siddende på plads i op til 12 timer. Fjern al Gishy Goo fra bøjlerne, inden du sover, spiser eller drikker.

**Kuvaus:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid -geeli on maustettu, tiksotrooppinen silikonielastomeeri, joka tarttuu lujasti braketteihin (kiinnikkeisiin) ja kaarilankaan. Se toimitetaan kaksisylinterisessä ruiskussa. Toisessa sylinterissä on valkoista ainetta (aktivaattoria). Toisessa sylinterissä on kellahtavaa perusainetta. Potilas pursottaa herneen kokoisen palan Gishy-Goota kämmenelleen, sekoittaa sen ja asettaa ärsytystä aiheuttavan kiinnikkeen tai kaarilangan kohdalle. Tuote kovettuu kahdessa minuutissa ja pysyy paikallaan jopa 12 tuntia.

**Käyttöaiheet:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid -geeli muodostaa ärsytystä lievittävän ja suojaavan mekaanisen aidakkeen oikomislaitteiston ja ärtyneiden kudosten väliin. Potilas levittää Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid -geeliä ärsytystä aiheuttaviin braketteihin (kiinnikkeisiin), kaarilankoihin kiskoihin ja kiinteisiin tai liikkuviin oikomislaitteisiin.

**Säilytys:**

Säilytä Gishy Goo huonelämpötilassa. Älä säilytä sitä kuumassa paikassa tai suorassa auringonvalossa, sillä sen seurauksena Gishy Goo ei ehkä hyödy kunnolla.

**Yleisiä varoituksia ja varotoimenpiteitä:**

1. Varoitus: Älä käytä, jos olet allerginen silikoneille.
2. Älä käsittele lateksikäsineillä.
3. Suosittelemme, että alle 12-vuotiaita lapsia valvotaan tai autetaan heidän käyttäessään Gishy Goota. Gishy Goo voi aiheuttaa tukehtumisriskin alle 4-vuotiaille lapsille.
4. Älä syö hyttelöä. (Suuret määrät voivat aiheuttaa tukehtumisriskin).
5. Laita enintään herneen kokoinen määrä Gishy Goota kuhunkin ärtyneeseen kohtaan. Jos pursotat ainetta liikaa, hävitä se ja yritä uudestaan.
6. Sinun pitää sekoittaa sama määrä valkoista ja värillistä Gishy Goota. Jos aineita ei ole yhtä paljon, hävitä ne ja yritä uudestaan.
7. Poista Gishy Goo braketeista tukehtumisvaaran välttämiseksi ennen nukkumaan menoa, syömistä tai juomista.
8. Säilytä Gishy Goo huonelämpötilassa.
9. Älä säilytä Gishy Goota lämmityslaitteiden lähellä tai jätä sitä kuumaan autoon, sillä sen seurauksena hyytyminen voi häiriintyä.
10. Älä pursota Gishy Goota vaatteisiin tai tekstiileille, sillä se saattaa aiheuttaa tahroja.



Irrota korkki kiertämällä sitä vasemmalle neljäosakierrosta (korkki kiertyy vain yhteen suuntaan) ja vetämällä korkki irti.



Pursota herneen kokoinen määrä sormeen tai kovalle pinnalle. Varmista, että pursotat saman määrän sekä valkoista että värillistä ainetta. Jos vain yhtä ainetta pursuaa, hävitä se ja yritä uudestaan.



Sekoita käsin noin 10 sekunnin ajan.



Levitä Gishy Goota ärsytystä aiheuttavan braketin päälle. Gishy Goo hyytyy noin kahdessa minuutissa.



Pane korkki käytön jälkeen takaisin ja kierrä neljäosakierrosta oikealle. Varmista, että korkki on tiukasti kiinni.

Gishy Goo voidaan jättää paikalleen jopa 12 tunnin ajaksi. Poista kaikki Gishy Goo braketeista ennen kuin menet nukkumaan, syöt tai juot.

**Beskrivelse:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid er en smaksatt, tiksotropisk, silikoneelastomer som festes godt til braketter og vaier. Det kommer i en sprøyte med to holdere. En holder har et hvitt aktivatormateriale. Den andre har et lysegult basemateriale. Bruk omtrent like mye som en ert på brakett eller vaier, på irritasjonspunktet. Produktet setter seg på to minutter og forblir værende i opptil 12 timer.

**Indikasjoner:**

Gishy Goo™ Silicone Bracket Relief Aid sørger for mekanisk avlastning og en beskyttende barriere som hindrer irritasjon av mykt vev, forårsaket av kjeveortopedisk apparater. Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid påføres irritasjonspunktet på brakett, vaier og faste/funksjonelle apparater.

**Oppbevaring:**

Gishy Goo skal oppbevares ved romtemperatur. Ikke oppbevar på varme steder eller i direkte sollys, da dette kan hindre skikkelig herding av Gishy Goo.

**Generelle advarsler og forholdsregler:**

1. Advarsel: Ikke bruk dette produktet dersom du er allergisk mot silikon.
2. Ikke håndter dette produktet mens du bruker gummihansker.
3. Vi anbefaler på det sterkeste at barn under 12 år får hjelp av foreldrene/foresatte når de påfører og bruker Gishy Goo. Gishy Goo kan utgjøre en kvelningsfare for barn i alderen 4 år og yngre.
4. Ikke svelg. (Større mengder kan utgjøre en kvelningsfare.)
5. Maksimal mengde Gishy Goo på hvert irriterte sted er omtrent på størrelse med en ert. Hvis du trykker ut for mye, kast det og prøv igjen.
6. Du skal blande like mengder hvit og farget Gishy Goo. Hvis du ikke har like mye av hver, kast det og prøv igjen.
7. Du må ta Gishy Goo av klammene før du sover, spiser eller drikker slik at du unngår fare for kvelning.
8. Oppbevar Gishy Goo i romtemperatur.
9. Ikke oppbevar Gishy Goo i nærheten av varmeapparater eller i oppvarmede biler, fordi dette kan gjøre det vanskelig å herde.
10. Ikke klem ut eller ta Gishy Goo på klær eller tekstiler da det kan sette flekker.



Fjern lokket ved å vri det litt mot venstre (lokket kan bare vris en vei), og dra deretter av lokket.



Klem ut en mengde på størrelse med en ert på fingeren din, eller en hard flate. Pass på at det er like mye hvit og farget Gishy Goo. Hvis bare én farge kommer ut, må du kaste det. Prøv deretter på nytt.



Bland for hånd i ca. 10 sekunder.



Legg ferdigblandet Gishy Goo på klammene der hvor det er ømt. Det tar ca. 2 minutter for Gishy Goo å herde.



For å skru på lokket må det vris litt mot høyre. Pass på at lokket sitter godt på.

Gishy Goo varer opp til 12 timer. Fjern Gishy Goo fra klammene før du legger deg, spiser eller drikker.

**Περιγραφή:**

Το βοηθητικό ανακούφισης αγκίστρων από σιλικόνη Gishy Goo™ είναι ένα θιξοτροπικό ελαστομερές από σιλικόνη με γεύση, το οποίο σταθεροποιείται ασφαλώς στα άγκιστρα και στα σύρματα. Παρέχεται σε σύριγγα με δύο κυλίνδρους. Ο ένας κύλινδρος περιέχει ένα λευκό υλικό ενεργοποίησης. Ο άλλος κύλινδρος περιέχει ένα ελαφρά κίτρινο υλικό βάσης. Μια ποσότητα σε μέγεθος μπιζελιού τοποθετείται στο άγκιστρο ή στα σύρματα, στο σημείο του ερεθισμού. Το προϊόν σκληραίνει σε δύο λεπτά και παραμένει στη θέση του έως 12 ώρες.

**Ενδείξεις:**

Το βοηθητικό ανακούφισης αγκίστρων από σιλικόνη Gishy Goo™ παρέχει μηχανική ανακούφιση και προστατευτικό φράγμα για να αποτρέψει τον ερεθισμό μαλακών ιστών που προκαλείται από ορθοδοντικές συσκευές. Το βοηθητικό ανακούφισης αγκίστρων από σιλικόνη Gishy Goo τοποθετείται στα σημεία ερεθισμού σε άγκιστρα, σύρματα και σε σταθερές/λειτουργικές συσκευές.

**Αποθήκευση:**

Φυλάξτε το Gishy Goo σε θερμοκρασία δωματίου. Μην το αποθηκεύετε σε ζεστές τοποθεσίες ούτε σε άμεσο ηλιακό φως, διότι ενδέχεται να μην σκληρύνει κατάλληλα το Gishy Goo.

**Γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:**

1. Προειδοποίηση: Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε αλλεργία σε σιλικόνη.
2. Μην το μεταχειρίζεστε χρησιμοποιώντας πλαστικά γάντια.
3. Συνιστούμε θερμά να επιτηρούνται τα παιδιά κάτω των 12 ετών ή να τα βοηθούν οι γονείς όταν χρησιμοποιούν και τοποθετούν το Gishy Goo. Το Gishy Goo ενδέχεται να προκαλέσει πνίξιμο σε παιδιά ηλικίας 4 ετών ή μικρότερα.
4. Μην το τρώτε. (Τα μεγάλα ποσά ενδέχεται να προκαλέσουν πνίξιμο).
5. Το μέγιστο ποσοστό Gishy Goo για κάθε σημείο είναι περίπου στο μέγεθος μπιζελιού. Εάν βάλετε πολύ, πετάξτε και ξαναπροσπαθήστε.
6. Πρέπει να αναμιγνύετε ίσα ποσοστά από άσπρο και έγχρωμο Gishy Goo. Εάν δεν έχετε τα ίδια ποσοστά, πετάξτε το και ξαναπροσπαθήστε.
7. Βγάλτε το Gishy Goo από τα άγκιστρα προτού κοιμηθείτε, φάτε ή πείτε, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού.
8. Φυλάξτε το Gishy Goo σε θερμοκρασία δωματίου.
9. Μην αποθηκεύετε το Gishy Goo κοντά σε καλοριφέρ ούτε να το αφήνετε μέσα σε ζεστά αυτοκίνητα, διότι ενδέχεται να μη σκληρύνει αποτελεσματικά.
10. Μην πιέζετε ούτε να κολλάτε το Gishy Goo σε ρούχα από ύφασμα, διότι ενδέχεται να λεκιάσουν.





Αφαιρέστε το μπλε πώμα περιστρέφοντάς το κατά ένα τέταρτο της στροφής (το πώμα περιστρέφεται μόνο κατά ένα τρόπο) και βγάλτε το πώμα.



Βάλτε ένα ποσοστό ίσα με ένα μπιζέλι στο δάχτυλο ή σε σκληρή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το ίδιο ποσοστό από άσπρο και έγχρωμο υλικό. Εάν βγει μόνο ένα χρώμα, πετάξτε αυτό το υλικό και ξαναπροσπαθήστε.



Το αναμιγνύετε με το χέρι επί 10 δευτερόλεπτα περίπου.



Θέστε το αναμεμιγμένο Gishy Goo στα άγκιστρα στο σημείο ερεθισμού. Το Gishy Goo παίρνει περίπου 2 λεπτά για να σκληρύνει.



Μετά τη χρήση, επανατοποθετήστε το μπλε πώμα και περιστρέψτε το κατά ένα τέταρτο της στροφής δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το μπλε πώμα έχει σφίχτει.

Το Gishy Goo μπορεί να παραμείνει στη θέση του επί 12 ώρες. Αφαιρέστε όλο το Gishy Goo από τα άγκιστρα πριν κοιμηθείτε, φάτε ή πιείτε.

**EXP**



5020C = LOT

5020C = MM

5020C = YYYY



EN- See Instructions  
DE- Siehe Anleitung  
FR- Cf. instructions  
NL- Zie gebruiksaanwijzing  
IT- Vedere le istruzioni  
ES- Vea las Instrucciones  
PT- Veja as instruções  
SV- Se anvisningar  
DA- Se brugsanvisningen  
FI- Lue käyttöohjeet  
NO- Se instruksjoner  
EL- Δείτε τις οδηγίες



EN- Manufacturer  
DE- Hersteller  
FR- Fabricant  
NL- Fabrikant  
IT- Fabbricante  
ES- Fabricante  
PT- Fabricante  
SV- Tillverkare  
DA- Producent  
FI- Valmistaja  
NO- Produsent  
EL- Κατασκευαστής



EN- Keep out of reach of children  
DE- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren  
FR- Tenir hors de la portée des enfants  
NL- Buiten bereik van kinderen houden  
IT- Tenere lontano dalla portata dei bambini  
ES- Mantenga alejado del alcance de los niños  
PT- Mantenha o produto fora do alcance de crianças  
SV- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn  
DA- Opbevares utilgængeligt for børn  
FI- Pidä poissa lasten ulottuvilta  
NO- Holdes utilgjengelig for barn  
EL- Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά



EN- Store at room temperature  
DE- Bei Raumtemperatur lagern  
FR- Entreposer à température ambiante  
NL- Bij kamertemperatuur bewaren  
IT- Conservare a temperatura ambiente  
ES- Almacene a temperatura ambiente  
PT- Armazene em temperatura ambiente  
SV- Förvaras i rumstemperatur  
DA- Opbevares ved stuetemperatur  
FI- Säilytä huoneenlämmössä  
NO- Lagre ved romtemperatur  
EL- Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου





Manufactured for:



505 West 10200 South  
South Jordan, UT 84095 USA  
Toll Free: 1 (888) 863-5883  
Outside U.S. Call: +1 (801) 553-4177  
[www.opalorthodontics.com](http://www.opalorthodontics.com)



MPG Service GmbH  
Gereonstrasse 34-36  
D-50670 Cologne, Germany

Made in Germany  
© 2016 Opal Orthodontics. All rights reserved.